

Pacjenci po trzeciej fali pandemii 2



Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1000 respondentów w wieku 18 lat wzwyż w lipcu 2021r. Badanie było reprezentatywne ze względu na płeć, wiek oraz województwo.

Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z bezpośrednich konsultacji lekarskich (podstawowych lub specjalistycznych)? Jeżeli nie, to czym to było spowodowane? (N=362)



59,7%

Nie było takiej potrzeby



15,7%

Sprawdziłem, że nie było możliwości odbycia wizyty bezpośredniej



11,6%

Wystarczają mi teleporady



8%

Brak możliwości dodzwonienia się do przychodni/lekarza



7,2%

Moja obawa przed COVID-19



6,1%


Przekonanie, że i tak będzie kłopot lub nie będzie możliwości umówienia wizyty osobistej

Badani, którzy w okresie roku przed wybuchem pandemii, nie korzystali z konsultacji u lekarza specjalisty zostali poproszeni o wskazanie powodu, dlaczego nie korzystali z bezpośredniej konsultacji lekarskiej u lekarza specjalisty (N=300)



83,3%

Bo mnie było takiej potrzeby



16%

Nie mogłem/mogłam się nigdzie dostać ze względu na długie kolejki



0,7%

Inne, jakie?

Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z porady lekarza specjalisty?



tak: **55,1%**
wizyta bezpośrednia



tak: **31,1%**
teleporada



nie: **27,2%**


Dlaczego nie skorzystał/a Pan/i z pomocy lekarza specjalisty w dobie pandemii?



73,5%
Nie było takiej
potrzeby



10,7%
Brak miejsc, długa
kolejka oczekiwania



9,6%
Obawa przed
COVID-19



9,2%
Odwołanie wizyt

Czy ocenia Pan/i, że w okresie od początku pandemii pogorszyło się Pana/i zdrowie z powodu braku dostępu do opieki specjalistycznej/zabiegu/badań medycznych?



tak: **10,9%**
kobiety



tak: **5,5%**
mężczyźni

4,2%	18 - 29 lat
2,1%	30 - 39 lat
7,6%	40 - 49 lat
15,3%	50 - 59 lat
11,5%	60 lat i powyżej

Czy ocenia Pan/i, że w okresie od początku pandemii pogorszyło się Pana/i zdrowie z powodu braku dostępu do opieki specjalistycznej/zabiegu/badań medycznych? Jeżeli tak, to w jaki sposób? (N=83)



11 wskazań
zaostrenie objawów chorobowych



6 wskazań
pogorszony stan psychiczny



6 wskazań
problemy kardiologiczne



5 wskazań
nowe objawy lub choroby



4 wskazania
problemy z kręgosłupem



4 wskazania
brak dostępu do rehabilitacji



4 wskazania
choroba tarczycy



4 wskazania
zła diagnoza



3 wskazania
silny ból



3 wskazania
problemy neurologiczne




3 wskazania
problemy diabetologiczne




4 wskazania
kłopoty z uzębieniem


Jeśli niezależnie od sytuacji epidemicznej będzie zagwarantowane bezpieczeństwo covidowe w trakcie wizyt bezpośrednich, to czy będzie Pan/Pani korzystał/a z nich częściej czy rzadziej niż przed pandemią?



Dlaczego będzie Pan/Pani korzystał/a z wizyt bezpośrednich rzadziej niż przed pandemią? (N=65)



Dlaczego będzie Pan/Pani korzystał/a z nich częściej niż przed pandemią? (N=193)



Wnioski



7 na 10 badanych w ciągu roku **przed wybuchem pandemii** (luty 2019 – luty 2020) odbyło **wizytę bezpośrednią z lekarzem specjalistą**. Ta grupa badanych na konsultacje specjalistyczne udała się średnio 3 razy w badanym okresie czasu.



Badani, którzy w badanym okresie nie korzystali z konsultacji specjalistycznych najczęściej wskazywali, że po prostu **nie mieli takiej potrzeby**.



Ponad połowa badanych, od wybuchu pandemii, skorzystała z porady **lekarza specjalisty w formie wizyty bezpośredniej**.



Respondenci, którzy nie skorzystali z pomocy specjalisty poproszeni o wskazanie powodu swojej decyzji przyznali, że **nie mieli potrzeby** udania się na konsultacje z lekarzem specjalistą.



Co dwunasty badany przyznał, że od początku pandemii ich **stan zdrowia uległ pogorszeniu** z powodu braku dostępu do opieki specjalistycznej, zabiegu i/lub badań medycznych, najczęściej w formie **zaostżenia występujących już objawów**.



Niemal 2/3 ankietowanych uznało, że bez względu na sytuację epidemiczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa covidowego w przychodniach, ich **częstotliwość korzystania z wizyt bezpośrednich będzie taka sama jak przed pandemią**. **Niemal połowa** ankietowanych, którzy będą korzystać z wizyty bezpośredniej **rzadziej niż przed pandemią**, wskazało że **nie widzi potrzeby odbywania aż tylu wizyt bezpośrednich**, zaś **niemal 2/5** uznało, że część wizyt bezpośrednich **można zastąpić teleporadą**. W przypadku ankietowanych, którzy uznali że będą korzystać z **wizyt bezpośrednich częściej** niż przed pandemią, najczęściej jako powód podawali oni to, że mają **poczucie, że muszą bardziej zadbać o swoje zdrowie**.

